


Ficha Río Camesa (ruta familiar)

1.- Perfil longitudinal del recorrido



2.- Cuadro de interés

Horario aproximado: 3 ½ h.

Desnivel: 100 m

Distancia horizontal: 8 Km

Tipo de recorrido: Circular

Tipo de firme: pista forestal, carretera local, sendero

Dificultad: Baja

Punto de inicio y final del recorrido: Iglesia de San Juan, La Mata de Hoz (Valdeolea).

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 422.008,90 m. Y: 4.754.174,80 m.

3.- Hábitats

6510 Prados pobres de siega de baja altitud

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*

9230 Robledales galaico-portugueses con *Quercus pyrenaica* y *Quercus robur*

4030 Brezales secos europeos

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

4.- Especies significativas

Invertebrados terrestres: ciervo volante (*Lucanus cervus*), doncella de ondas rojas (*Euphydrias aurinia*)

Aves: milano negro (*Milvus migrans*), milano real (*Milvus milvus*), buitres leonados (*Gyps fulvus*), águila calzada (*Hieraetus pennatus*), águila culebrera (*Circaetus gallicus*), alimoche (*Neophron percnopterus*), collalba gris (*Oenanthe oenanthe*), colirrojo tizón (*Phoenicurus ochrurus*), alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*), lavandera blanca (*Motacilla alba*), lavandera cascadeña (*Motacilla citreola*), martín pescador (*Alcedo atthis*), mirlo acuático (*Cinclus cinclus*).

Mamíferos: ciervo (*Cervus elaphus*), corzo (*Capreolus capreolus*), jabalí (*Sus scrofa*), nutria (*Lutra lutra*), armiño (*Mustela erminea*)

Reptiles: lagartija roquera (*Podarcis muralis*), lagarto verde (*Lacerta bilineata*), lución (*Anguis fragilis*), culebra de collar (*Natrix natrix*).

5.- Descripción de la ruta

Pese a su reducida extensión y su modesta apariencia, el río Camesa representa una notable singularidad ecológica en el contexto atlántico en que se inscribe, en tanto es el único río de Cantabria que vierte a la cuenca del Duero, como tributario del Pisuerga. El Camesa nace en la vertiente meridional de la Sierra de Híjar, entre los escobales y brezales de la cuenca palentina de Peña Rubia. En cabecera se distingue por el extraordinario grado de conservación del entorno ribereño y por la elevada naturalidad de sus aguas, lo que conlleva la presencia de mamíferos como la nutria o de peces como la bermejuela o la boga de río, taxones de la Región Atlántica incluidos en el Anejo II de la Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. En la región, además, son exclusivos del Camesa el barbo común, el bordillo y la boga del Duero. Robledales y brezales son los ecosistemas con mayor cobertura en su entorno. La formación ribereña, de gran atractivo paisajístico, aparece compuesta básicamente por sauces y chopos. Las saucedas varían en su composición a lo largo del curso del río: cuando este muestra un carácter más torrencial, en la cabecera, es dominante la presencia de *Salix atrocinerea*, mientras *Salix eleagnos* es más frecuente en los tramos bajos, donde el régimen fluvial es más estable y regular. Destacan entre las singularidades ecológicas del río y su entorno la pequeña población de nenúfar amarillo de Mataporquera, única en Cantabria, y la presencia invernal de grandes grupos de milanos reales.