


Ficha Hayedo de la Guariza (Ruta Familiar)

1.- Perfil longitudinal del recorrido



2.- Cuadro de interés

Horario aproximado: 4 h

Desnivel: 100 m

Distancia horizontal: 8 Km

Tipo de recorrido: Circular

Tipo de firme: pista forestal, sendero

Dificultad: baja

Punto de inicio y final del recorrido: nacimiento del Ebro, Fontibre (Hermandad de Campoo de Suso)

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 402.958,44 m. Y: 4.763.369 m.

3.- Hábitats

4030 Brezales secos (todos los subtipos)

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de *Ilex* y a veces de *Taxus*

92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*

4.- Especies significativas

Invertebrados terrestres: ciervo volante (*Lucanus cervus*), caracol de Quimper (*Elona quimperiana*), babosa terrestre (*Geomalacus maculosus*).

Aves: pico mediano (*Dendrocopos medius*), trepador azul (*Sitta europea*), agateador común (*Certhia brachydactyla*), pito real (*Picus viridis*), milano real (*Milvus milvus*), tarabilla común (*Saxicola torquata*), pinzón (*Fringilla coelebs*), gallineta (*Gallinula chloropus*), ánade azulón (*Anas platyrhynchos*), martín pescador (*Alcedo atthis*), mirlo acuático (*Cinclus cinclus*), lavandera blanca (*Motacilla alba*), lavandera cascadeña (*Motacilla citreola*)

Mamíferos: corzo (*Capreolus capreolus*), jabalí (*Sus scrofa*), garduña (*Martes foina*), ratón de campo (*Apodemus sylvaticus*), musaraña (*Crocidura russula*), marta (*Martes martes*).

Reptiles: lagarto verde (*Lacerta bilineata*), culebra de collar (*Natrix natrix*), lagartija roquera (*Podarcis muralis*), víbora de Seoane (*Vipera seoanei*)

5.- Descripción del itinerario

El itinerario se inicia en el aparcamiento del nacimiento del Ebro; el camino conduce desde allí, bordeando la fresneda, hacia la Robleda de Villacantid, ofreciendo una amplia panorámica de las montañas de Campoo. El contraste entre la línea de cumbres y el fondo de valle es uno de los aspectos más relevantes de estas montañas. Las montañas de Campoo ocupan la encrucijada geológica que define el contacto del zócalo con la cobertera sedimentaria terciaria. Los dos principales conjuntos de la unidad, el Cordel e Híjar se alinean en torno al vértice del Pico Tres Mares. La Sierra de Híjar parte igualmente de Tres Mares. El itinerario recorre parte de la vega de Villacantid y un rosario de pequeños rodales de un bosque mixto dominado por quejigos, acebos y endrinos. Los Cagigales, como se conoce aquí al bosque de mayor enjundia, cuenta además con algunos voluminosos ejemplares de roble albar. En el trayecto hacia el Norte se encara la ascensión, por su ladera Sur, del monte de La Guariza, atalaya generosa sobre las vegas de Reinosa, Matamorosa y el Embalse del Ebro. La geomorfología fluvial ligada al curso del Híjar ha modelado el fondo del valle formando amplias terrazas entre Naveda y Celada, que se prolongan hasta Requejo y Matamorosa. La amplia vega fluvial da cabida a los mejores pastos de Campoo de Suso, y acoge a los núcleos de población más importantes de la comarca. El retorno a las fuentes del Ebro que citara hace dos mil años Plinio el Viejo, permite recorrer la umbrosa ladera del hayedo de La Guariza, y reconocer algunas de las formaciones de la ribera del río